

Espèces similaires

Au Luxembourg, seul le Castor et le Ragondin peuvent porter à confusion pour l'identification du Rat musqué. Alors que le Castor d'Europe est une espèce indigène, le Ragondin est comme le Rat musqué une espèce exotique envahissante.

Espèce indigène

Castor d'Europe

Castor fiber

Queue très aplatie

Pas de vibrisses apparentes

Taille corps: entre 70-100 cm

Taille queue: 25-37 cm



© Jiri Bohdal

Espèce exotique

Ragondin

Myocastor coypus

Queue cylindrique

Vibrisses couleur blanche

Incisives couleur orangée

Taille corps: environ 50 cm

Taille queue: 25-45 cm



© Guillaume Koch

Références et informations complémentaires

<https://neobiota.lu/ondatra-zibethicus/>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_musqu%C3%A9

http://www.fgdon53.fr/rat_musque_ondrata_zybeticus.html

http://materiel-pedagogique.com/Biologie/12037-Biologie_rat_musqu__district_Zeya_de_la_r_gion_de_l_Amour.html



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Administration de la nature et des forêts